

Patienteninformation

Labordiagnostik bei Parodontitis ,Micro-IDdent‘

Labor Dr. Brunner

Mainastr. 48 a/b
78464 Konstanz
Tel. 07531/ 81730

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Bei der Entstehung der Parodontitis sind anaerob wachsende Bakterien beteiligt. Entzündungen als Reaktion auf diese Bakterien begünstigen den Abbau des Parodonts (Zahnhalteapparats) mit nachfolgender Parodontitis!

Die Bakterien sind in herkömmlichen Mundabstrichen nur sehr schwer nachweisbar. Wir weisen daher **DNA** dieser Mikroorganismen mit modernen molekularbiologischen Methoden nach und ermöglichen so eine gezielte Behandlung der Infektionserreger. Ein positiver Nachweis dieser Bakterien sollte in der Regel begleitend eine Antibiotikatherapie zur Folge haben.

Welches Material benötigen wir?

In der Regel reicht **ein Poolabstrich**, d.h. Abstrich von mehreren (potentiell) befallenen Stellen, aber in **einem** Röhrchen gepoolt, um die Kosten gering zu halten. Entsprechende Abstrichbestecke können bei uns bestellt werden. Die meisten Zahnärzte haben entsprechende Entnahmesets vorliegen. Der Abstrich sollte fachgerecht, d.h. durch Ihren Zahnarzt vorgenommen werden.

Welche Kosten fallen an?

-für Privatpatienten: 113,85 €
-für selbstzahlende Kassenpatienten: 50 €

Bitte beachten Sie, dass die Kosten von den gesetzlichen Krankenkassen nicht übernommen werden.

Therapieempfehlung zur unterstützenden Therapie marginaler Parodontitiden

(aus: FLEMMING & KARCH: DGZMK-Stellungnahme, Juni 1998)

- Metronidazol oder Clindamycin system.:
bei Nachweis von *P. gingivalis*, *P. intermedia*, *B. forsythus*, *T. denticola*
3 x täglich 400 mg/ 8 Tage Metronidazol
oder
4 x täglich 300mg/ 7 Tage Clindamycin

- Amoxicillin + Metronidazol systemisch:
bei Nachweis von *P. gingivalis*, *P. intermedia*, *B. forsythus*, *T. denticola* und *A. actinomycetemcomitans*)
3 x täglich 500 mg Amox. + 400 mg Metronid. für 8 Tage

- bei Penicillinallergie Doxycyclin system.:
1. Tag: 1 x täglich 200 mg
2.-21.Tag: 1 x täglich 100 mg

(Metronidazol und Doxycyclin sind in der Schwangerschaft kontra-indiziert!)

**Haben Sie weitere Fragen?
Dann wenden Sie sich bitte an uns.**

Ihr Praxisteam